

FICHE DE PRÉVENTION

PUÉRICULTURE ET JOUETS

SUCETTES DE PUÉRICULTURE

(Mise à jour – Novembre 2014)



Censée satisfaire le besoin physiologique de téter du nourrisson, la sucette est largement utilisée à d'autres fins : calmer ses pleurs, le faire patienter avant le repas, l'endormir, etc... Mal utilisée, elle peut être à l'origine d'accidents graves, tel que l'étouffement ou la strangulation. Les risques d'accident sont de deux ordres :

- **Par ingestion** : la tétérille se détache de la collerette ou est déchirée par l'enfant qui a déjà des dents. Elle se bloque au fond de la gorge et l'étouffe. C'est le risque le plus sérieux. En effet, l'ingestion éventuelle de collerettes, pour spectaculaire qu'elle est, n'entraîne pas d'asphyxie car elles sont toutes munies de trous qui permettent à l'enfant de respirer.
- **Par strangulation** : la sucette est attachée au cou de l'enfant par un cordon qui se prend dans un élément d'article de puériculture et étrangle l'enfant.

TEXTES APPLICABLES

(Ces textes sont donnés à titre informatif et ne sauraient se substituer à la réglementation en vigueur)

- ➔ Norme NF EN 1400+AI (juin 2014) : Articles de puériculture - Sucettes pour nourrissons et jeunes enfants - Exigences de sécurité et méthodes d'essai.
- ➔ Décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 modifié relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.

- ➔ Décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 modifié relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux.

CONSEILS DE PREVENTION

- ➔ Vérifiez que l'enfant n'est pas allergique au latex, consultez un médecin s'il y a des antécédents familiaux et au moindre signe suspect.
- ➔ N'achetez pas de sucette avec un ruban, une cordelette, un cordon ou un fil car ces éléments présentent un risque d'étranglement.
- ➔ Préférez les sucettes dotées d'une petite cordelette à fixer sur le vêtement de l'enfant. Toutefois, faites attention aux attaches qui peuvent aussi se détacher du vêtement et présenter un risque d'étouffement.
- ➔ Vérifiez que la sucette est suffisamment solide pour ne pas pouvoir se décomposer en petites pièces qui pourraient provoquer l'étouffement ou la suffocation. De même, la tétérelle ne doit pas pouvoir se dissocier de l'anneau même si l'on exerce une forte traction.
- ➔ La collerette doit être aérée et suffisamment large et dure pour que la sucette ne puisse pas entrer complètement dans la bouche du bébé.
- ➔ La sucette peut se détériorer au fil du temps ou à force d'être exposée à la nourriture, au soleil, etc. Vérifiez régulièrement que sa texture n'est pas endommagée ; le cas échéant, jetez-la immédiatement.
- ➔ Ne mettez pas la sucette en contact avec des produits détergents agressifs et, en particulier, en machine à laver.

QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT ?

- ➔ **En cas d'asphyxie qui peut se produire par agitation brutale et violente de la tétérelle qui se colle au fond de la bouche et obstrue la gorge :**

- Appelez les services de secours : SAMU (15), Sapeurs-Pompiers (18).

- Réalisez immédiatement la **manœuvre de Heimlich**. Placez-vous derrière l'enfant, passez vos bras sous les siens, mettez un poing sur la partie haute et médiane de l'abdomen au-dessus du nombril, juste en-dessous du sternum. Placez l'autre main sur la première, les avant-bras appuyant sur les côtes. Tirez violemment vers vous de bas en haut et d'avant en arrière, comme pour couper la victime en deux.



- Si la victime est un nourrisson, utilisez la **manœuvre de Mofenson** : l'enfant est placé à califourchon sur votre cuisse, tête dépassant son genou. Frappez violemment entre les deux omoplates avec le plat de la main.



- ➡ Ces manœuvres peuvent être répétées plusieurs fois de suite en quelques secondes.
- ➡ Seul l'apprentissage des gestes de premiers secours permet de réaliser ces manœuvres dans de bonnes conditions.